

Correction de l'interrogation de PSE sur les IST

- 1- Le type de microorganisme responsable de l'infection à HPV est le virus.
- 2- Les principales conséquences à long terme sur la santé d'une infection au HPV sont des risques de cancers du col de l'utérus, de la sphère ORL, de l'anus, de la vulve et du vagin et du pénis.
- 3- L'infection au HPV est considérée comme une infection sexuellement transmissible car elle est due à une contamination virale lors de rapports sexuels.
- 4- Les autorités ont décidé d'élargir la vaccination aux garçons car elle offre une protection à long terme car les garçons sont également porteurs et peuvent donc le transmettre à leurs partenaires. De plus, et il peut y avoir des conséquences pour les garçons en cas de contamination (cancer du pénis).
- 5- Les actions mises en œuvre dans le cadre des missions du CeGIDD pour limiter la transmission des IST sont : dépistages des IST, vaccination contre les virus (HPV, hépatite A et B), réalisation d'actions d'information et de prévention en direction des publics ciblés.
- 6- Le moyen de prévention individuel qui protège de toutes les IST est l'utilisation du préservatif.
- 7- Un parent peut décider de faire participer son fils à la campagne de vaccination afin de le protéger leur enfant et de prévenir des conséquences d'une infection au HPV (verrues anogénitales, cancers de la sphère ORL, cancer du pénis, cancer de l'anus).
- 8- Les fumées chirurgicales constituent le danger. La situation dangereuse est le traitement par laser de lésions HPV. Et enfin, l'événement déclencheur est le grand nombre d'infections à papillomavirus.
- 9- Une mesure de prévention individuelle sera de porter une protection oculaire appropriée. Une mesure collective serait d'installer une ventilation par aspiration à la source.
- 10- Le principe de la vaccination repose sur le fait d'introduire dans le corps une forme inactive du virus pour que le corps reconnaisse ce virus et produise des anticorps qui vont lui permettre de se défendre lorsqu'il sera exposé au virus. En effet, le corps aura reconnu le virus par les défenses qui vont l'éliminer, la maladie ne va donc pas se développer.
- 11- Le chef du bloc opératoire préconise la vaccination car elle repose sur la prévention primaire qui permet d'agir avant l'apparition de l'infection pour diminuer la fréquence des nouveaux cas d'infection au HPV au sein du personnel hospitalisé